

Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie

Empfehlung Basistherapie Methotrexat

VORBEMERKUNG:

Patienten mit chronisch-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, die einer Basistherapie bedürfen, sollten mindestens einmal pro Jahr durch einen Facharzt für Rheumatologie konsiliarisch gesehen werden. Die Indikation zur Auswahl des Basistherapeutikums und Änderungen desselben bedürfen einer fachärztlichen Konsultation.

KONTROLLUNTERSUCHUNGEN:

Anamnese/Klinik:

- Nausea, Erbrechen, Oberbauchbeschwerden, Diarrhoe, Pruritus
- Husten, Dyspnoe
- Haut (Exanthem, Rheumaknoten), Schleimhäute (Infektionen, Ulzerationen)

Labor:

Zeitpunkt	Vor Therapie	1 Monat und bei Dosiserhöhung	2. – 6. Monat	Ab 6. Monat
Untersuchung				
Hämoglobin, MCV, Leukozyten (< 3 x 10 ³ /µl: Diff.), Thrombozyten	+	2 – 4-wöchentlich*	1 - 2-monatlich*	2 - 3-monatlich*
Kreatinin, ALAT (oder ASAT), alk. Phosphatase	+	2 – 4-wöchentlich*	1 - 2-monatlich*	2 - 3-monatlich*
Hepatitis B- / C-Serologie, (HIV-Serologie*)	+			
Albumin, Bilirubin	+	Bei ALAT-Anstieg 3 - 6-monatlich	Bei ALAT-Anstieg 3 - 6-monatlich	Bei ALAT-Anstieg 3 - 6-monatlich
Thorax-Röntgen	+			
Lungenfunktionsprüfung mit Diffusionskapazität und HR-CT	Empfehlenswert bei path. Röntgen*			

* Bei der Kontrollfrequenz ist neben der Dauer der Therapie insbesondere die Kinetik der Resultate und damit veränderte Risiken für unerwünschte Wirkungen zu berücksichtigen.

DOSIERUNG:

- Initiale Reduktion fakultativ: 5 mg bis 15 mg einmal pro Woche per os oder i.m./i.v./s.c. (Starke interindividuelle Schwankungen in der Bioverfügbarkeit)
- Erhaltungsdosis: 10 mg - 30 mg pro Woche

FOLSÄURESUBSTITUTION:

Unter Substitution mit Folsäure wurden weniger orale und gastrointestinale Nebenwirkungen beobachtet. Deshalb werden 5-10 mg Folsäure pro Woche empfohlen.

NEBENWIRKUNGEN UND VERHALTEN:

Nebenwirkung	Dosisreduktion	Unterbruch	Abbruch
Stomatitis Nausea, Oberbauchbeschwerden Diarrhoe GI-Blutung	+ + +	(+) +	(+)
Haarausfall	+	+	
Infektion		+	(+)
Leukopenie < 3 x 10 ³ /µl Thrombopenie < 100 x 10 ³ /µl Makrozytäre Anämie	Ec-Folsäurebestimmung	+ + (+)	(+) (+) (+)
Pneumonitis			+
Rheumaknoten / Exanthem	+	(+)	(+)
Persistierend erhöhte Transaminasen		+*	(+)

* Bestimmung von Albumin und Bilirubin alle 3-6 Monate, ggf. Leberbiopsie vor evtl. Fortsetzung des MTX

KONTRAINDIKATIONEN:

- Übermässiger Alkoholkonsum
- Lebererkrankungen (Leberzirrhose, Hepatitis, Leberinsuffizienz)
- Knochenmarkserkrankungen (Zytopenien, Folsäuremangel: Vorerst Substitution)
- Schwangerschaft, Stillen
- HIV-Positivität (relativ), chronische B-Hepatitis (HbsAG positiv)

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Medikamentöse Interaktionen (siehe unten)
- Keine Impfungen mit Lebendimpfstoffen
- Niereninsuffizienz (Dosis anpassen)
- vorbestehende Lungenerkrankung
- MTX kann im Allgemeinen perioperativ weitergegeben werden.
- vor geplanter Konzeption wird beim Mann aus Sicherheitsgründen ein 3-monatiges Pausieren von MTX, bei der Frau ein Absetzen 3 Monate vor geplanter Schwangerschaft empfohlen.
- bei Methotrexatüberdosierung: Leucovorin[®] = Antidot

INTERAKTIONEN:

- Knochenmarksdepression mit: Sulfonamiden, Trimethoprim, Diphenylhydantoin, Amidopyrinderivaten, Chloramphenicol, Sulfonylharnstoffen (Verdrängung von Methotrexat aus Albuminbindung und konsekutiv höherer freier Konzentration)
- Mögliche Interaktionen mit: Barbituraten, Tranquilizern, Tetrazyklinen, p-Aminobenzoesäure, Probenecid und nicht-steroidalen Entzündungshemmern

WIRKUNGSMECHANISMUS:

- Methotrexat ist ein Folsäure-Antagonist; bewirkt als Antimetabolit der Nukleinsäuresynthese eine intrazelluläre Hemmung der Dehydrofolat-Reduktase. Ferner wirkt MTX über Adenosin-Rezeptor vermittelte, Folat-unabhängige Mechanismen.
- **Wirkungseintritt** nach vier bis sechs Wochen
- Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit bei parenteraler Applikation am besten
- Interindividuelle Schwankung der gastrointestinalen Resorption bei peroraler Gabe (zwischen 20 % und 90 %)
- Elimination mit einer maximalen Halbwertszeit von zehn Stunden wegen enterohepatischem Kreislauf und langsamer Rückresorption aus verschiedenen Gewebekompartimenten
- Ausscheidung innert 24 Stunden zu 90 % über die Nieren

PRÄPARATE:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| - Methotrexat Farnos: | Amp. à 5 / 20 mg (2.5 mg/ml) | 10 Stück CHF 60,85 bzw. 100,35 |
| - Methotrexat Proreo | Amp. à 10 / 50 mg (10 mg/ml) | 10 bzw. 5 Stück CHF 62,65 bzw. 111,50 |
| - Methotrexat Teva | Amp. à 5 / 50 mg (2.5 bzw. 25mg/ml) | 1 Stück CHF 8,55 bzw. 20,20 |
| - Methotrexat Wyeth: | Amp. à 25 mg (25 mg/ml) | 1 Stück CHF 18,85 |
| | (Tabletten à 10 mg sind nicht kassenzulässig) | |
| - Metoject Fertigspritzen | à 10 bis 25 mg (10mg/ml) | 1 Stück CHF 46,40 – 62,30 |

Änderungen gegenüber den Empfehlungen von 2004 beruhen auf neuen Daten bzw. aktualisierten Empfehlungen anderer rheumatologischer Fachgesellschaften (insbesondere des American College of Rheumatology und der British Society for Rheumatology).